

Záradék:

Kifüggesztés ideje: 2025 JÚL 30.

Levétel ideje: 2025 AUG 16.



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2025. évre vonatkozó második védekezési felhívást teszi közzé a Badacsonyi és a Balaton-felvidéki borvidékek körülhatárolt területén elvégzendő 3. kötelező védekezés vonatkozásában:

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS II.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2025. évben is folyamatosan vizsgálja a körülhatárolt területen az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) egyedfejlődését és egyedszámának alakulását. A július 24-én elvégzett felmérés szerint egyes szőlőültetvényekben még megtalálhatóak voltak a kabóca utolsó (L₅) lárvastádiumú egyedei, ami azt jelenti, hogy feltehetőleg augusztus első napjaiban az összes egyed már teljesen kifejődik repülésre is képes imágóvá. Emellett a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a korábbi évek hasonló időszakához képest a kihelyezett sárgalapok kevesebb kifejlett alakot fogtak. A felhagyott illetve hagyományos ültetvényben még a védekezési küszöb környéki, az ökológiai ültetvényben már jóval az védekezési küszöb feletti egyedszámban. Ezt támasztja alá a csapdapontokon elvégzett hálózások eredményei is, mely szerint egyes ökológiai művelésben részesített szőlőültetvényekben növényenként legalább 1-2 kifejlett kabóca volt megtalálható.

A vizsgálatok eredményei alapján, ezért a harmadik kötelező védekezést augusztus első felében szükséges elvégezni a körülhatárolt terület minden szőlőtermő területén.

Az ökológiai ültetvényekben a magasabb egyedszám miatt a védekezést már a megadott periódus elején ajánlott végrehajtani.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagában nem elegendő, hanem a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése válhat indokolttá.

Az amerikai szőlőkabóca ellen a felhívás 1. számú mellékletében található táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Lényeges, hogy a kezelések során olyan növényvédő szereket használjon a szőlőtermelő, amelyek a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezettek, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia (lásd melléklet) pedig nem zárja ki a kifejlett alak elleni alkalmazásukat.

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001
Telefon: 88/590-472 e-mail: noveny.talajved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915

Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adatlappal lehetséges.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges.

Az agrár-környezetvédelmi programban szereplő kedvezményezettek a pályázati felhívás részletszabályait tartalmazó 2b. mellékletének 2.1 pontja értelmében jelen védekezési felhívás szerint a Nemzeti Irányító Hatóság által közleményben közzétett nem, vagy csak korlátozással használható növényvédő szert is felhasználhatnak a körülhatárolt területen belül. Az ilyen felhasználás **vis maior eseménynek minősül**, amely elismertetése a Nemzeti Kifizető Ügynökségnél szükséges. A vis maior elismerése iránti kérelmet és annak bekövetkezését igazoló dokumentumokat az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint a vis maior kérelem benyújtására szolgáló felületen keresztül kell benyújtania a kedvezményezetteknek.

Az agrár-ökológiai programban (AÖP) pedig a méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben gyakorlatot választóknak az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek használata tilos.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint, a szőlő sárgaság betegség tipikus tünetei az idei évben már megjelentek. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a kialakult bogyók töppedése is folyamatban van. **A szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezés másik pillére ebben az időszakban a szőlő növények folyamatos szemlézése, illetve a tüneteket mutató, a fertőzés forrását és a betegség fennmaradását biztosító tőkék leveles hajtásrendszerének eltávolítása a növényvédő szeres kezelés elvégzését követően.** Fontos, hogy ez után a tőke gyökerestől történő kivágása megtörténjen, akár a vegetáció végét követően is, illetve, a kivágott tőke helyét megjelölik. A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, még a leveles hajtások eltávolítása, a tőke kivágása előtt.

Az eredményes védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztesse a szomszédos termelők növényvédelmi, növény-egészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

Veszprém, 2025.07.29.

Takács Szabolcs főispán
nevében és megbízásából:



Odor Tamás
osztályvezető

A 2025. évi védekezési felhívás II. 1. számú melléklete

	Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma	EVI	Méh-veszélyesség
Kontakt	Decis ¹	deltametrin	III.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	7	mk
	Decis Mega (PL) ^{1,5}	deltametrin	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	7	mk
	Decis Forte ^{1,5}	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	Csemegezőlő: 7, Borszőlő: 30	mk
	Detector ^{1,5}	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	Csemegezőlő: 7, Borszőlő: 30	mk
	Kaiso Garden ^{2, 6}	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	K1 ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	Kaiso EG ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mv
	Kaiso Sorbie ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mv
	Wakizasi ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mv
	Hunter ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mv
	Jager EG ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mv
	Karate Zeon 5 CS (BG, PL, RO) ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	Karate Zeon 050 CS ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	Ninja Zeon 5 CS ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	Kendo 5 CS ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	Full 5 CS ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mk
	Lamdex Extra ^{2, 5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7	mv
	Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	I. ; II.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21	njk
	Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	I. ; II.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21	njk
	Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. ; II.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21	njk
	Laser ^{3, 5}	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	15	mk
	Nexsuba ^{3, 5}	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	15	mk
	Laser Duplo ^{3, 5}	spinozad	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	14	mk
	Limocide ³	narancsolaj	II.	6	7 nap	2. levél kiterülésétől (BBCH 12) fogyasztásra érettségig (BBCH 89)	1	kk
	Pyregard ³	piretrin	I.	2	-	-	7	kk
Felszívódó	Sivanto Prime ^{4, 1}	flupiradifuron	II.	1	-	zsendülés (BBCH 81)	14	nj
	Sanium System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	14	nj
	Deltam System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	14	nj
	Sivanto Energy ^{1,2,5}	deltametrin + flupiradifuron	I.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)	14	kv
	Exirel ¹	ciántranililiprol	I.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	10	kv
	NeemAzal-T/S3 ³	azadiraktin	III.	2	-	-	3	njk

Megjegyzés:

¹ agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de jelen védekezési felhívás alapján felhasználható

² agrár-környezetvédelmi programban kizárólag a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 10. pontja szerinti szakirányító írásbeli javaslatára használható vagy a „Növényvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” vállalat választásakor

³ ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása

⁴ tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkimélő technológiával juttatható ki.

⁵ virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkimélő technológiával juttatható ki.

njk: nem jelölés köteles, mk: mérsékelt kockázatos, mv: mérvékelt veszélyes, kk: kifejezetten kockázatos, kv: kifejezetten veszélyes

Az engedélyokiratok szerinti előírt növényvédelmi technológiák:

Decis: Amerikai szőlőkabóca ellen az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.

Decis Mega: Amerikai szőlőkabóca ellen az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.

Decis Forte, Detector: Az amerikai szőlőkabóca ellen az L3-L4 fokozatú lárvák, valamint a később megjelenő imágók rajzása idején javasolt a védekezést végre hajtani.

Kaiso Garden, K1: Amerikai szőlőkabóca ellen 2,5 gramm szer szükséges 10 liter vízhez. A permetezést az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni.

Kaiso EG, Kaiso Sorbie, Wakizasi, Hunter, Jager EG: Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 kg/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor.

Karate Zeon, Ninja Zeon 5 CS, Kendo 5 CS, Full 5 CS: Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor.

Lamdex Extra: Nincs előírt technológia.

Klartan 24 EW, Mavrik 24 EW, Monospel 24 EW: Az amerikai szőlőkabóca valamennyi fejlődési stádiuma ellen felhasználható. Elsősorban az L1-L3 fejlettségű lárvák ellen kell a védekezést időzíteni. Egy tenyészidőszak alatt maximum 2 alkalommal juttatható ki a készítmény. A további permetezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni. Nagyobb fertőzési nyomás esetén és az amerikai szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell alkalmazni.

Laser, Nexsuba: Amerikai szőlőkabóca ellen 0,4 l/ha dózissal a fiatal lárvák ellen szükséges kipermetezni.

Laser Duplo: Amerikai szőlőkabóca ellen 0,2 l/ha dózissal a fiatal lárvák ellen szükséges kipermetezni, a kezelés szükség esetén megismételhető.

Limocide: Szőlőben (bor- és csemege-) a szőlő-gubacsatka, tripszek és kabócák elleni permetezést előrejelzésre alapozva, a kártevők, illetve az első kártételi tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni.

Sivato Prime: Szőlőben amerikai szőlőkabóca ellen a második, harmadik stádiumú lárvák ellen célszerű védekezni. Mivel a kikelt lárvák a keléstől számított 30-40 napig nem képesek a fitoplazma terjesztésére ezért, az első lárvák megjelenésétől számított 30 nap után végzett kezeléssel tudjuk jó eséllyel a betegség terjedését megakadályozni. A fűrtvirágzat nyúlása idején a javasolt dózis 0,4 l/ha, a zsendülés idején azonban 0,5 l/ha alkalmazása javasolt.

Sanium System, Deltam System: Szőlőben (bor-, csemege-) szőlőkabóca fajok ellen a második, harmadik stádiumú lárvák ellen célszerű védekezni. Mivel a kikelt lárvák a keléstől számított 30-40 napig nem képesek a fitoplazma terjesztésére ezért, az első lárvák megjelenésétől számított 30 nap után végzett kezeléssel lehet jó eséllyel a betegség terjedését megakadályozni.

Sivanto Energy: Szőlőben az amerikai szőlőkabóca lárvái és kifejlett egyedei ellen előrejelzésre alapozva kell a védekezést végrehajtani. A lárvák egyedszámát a levelek fonákán végzett egyedszámolással, a rajzó imágók népességét ragadós sárgalappal végzett csapdázással lehet megállapítani.

Exirel: Szőlőkabócák ellen a fiatal lárvastádiumok (L1-L3) megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.

NeemAzal-T/S: Nincs előírt technológia.

Pyregard: Szőlőben amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) ellen növényvizsgálat alapján a lárvák és a kifejlett alak ellen.

